



PREPARAZIONE

Ambulatorio di Endoscopia Digestiva
Tel. 0421/338442
Lun-mart-merc-giov dalle 8.00 alle 14.00
Reparto di Chirurgia
0421/338430-431
24h/24h

- osservare il **digiuno** dalla mezzanotte
- assumere terapia farmacologica fino al giorno prima, nulla la mattina dell'esame
- sospendere farmaci IPP/protettori gastrici (pantorc, antra, etc) o antiacidi (Maalox, Riopan, Gaviscon), almeno 2 settimane prima l'esecuzione dell'esame
- per l'eventuale terapia antidiabetica (insulina/orale) far riferimento al paragrafo dedicato
- per l'eventuale terapia anticoagulante far riferimento al paragrafo dedicato

COSA PORTARE

- impegnativa per esofagogastroduodenoscopia
- documentazione relativa ad altri problemi di salute
- documentazione di esami precedenti con eventuali referti istologici se disponibili

IN OSPEDALE

- l'utente sottoposto a colonscopia deve essere accompagnato da una persona in grado di poter attendere fino alla fine dell'esame e di poter condurre un veicolo
- l'ora di esecuzione dell'esame può essere diversa da quella dell'appuntamento
- ultimata la gastroscopia si dovrà rimanere in osservazione presso i locali dell'endoscopia digestiva per circa 30 minuti
- i farmaci sedativi **eventualmente** usati durante l'esame possono causare sonnolenza. La guida di veicoli e firma di documenti non è pertanto opportuna per almeno **24 ore**

A CASA

- osservare il digiuno per almeno un ora dalla fine dell'esame e poi cominciare ad alimentarsi regolarmente
- se venissero eseguiti prelievi biotici mantenere il digiuno per 1 ora e mezza dopo l'esecuzione dell'esame, poi cominciare a bere liquidi tiepidi e dopo 4 ore cominciare ad alimentarsi
- gli eventuali prelievi eseguiti durante la gastroscopia possono causare un leggero sanguinamento; se feci bigie (nere), il paziente deve chiamare e presentarsi per una visita di controllo.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Terapie farmacologiche:

Anticoagulante o antiaggregante: : il paziente deve rivolgersi al proprio curante per la sospensione di tale terapia e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva. Il paziente dovrà quindi presentarsi il giorno dell'esame munito di esami del sangue con i valori di INR, eseguiti nei giorni precedenti all'esame.

- **Coumadin (Warfarin), Sintrom (Acenocumarolo)** devono essere sospesi almeno 5 giorni prima dell'esame con la metodica sopra illustrata
- **Fans-cardioaspirina:** devono essere sospesi 7 giorni prima con la metodica sopra illustrata
- **Ticlopidina:** deve essere sospesa almeno 15 giorni prima con la metodica sopra illustrata
- **Plavix (Clopidrogel):** deve essere sospeso almeno 7 giorni prima con la metodica sopra illustrata

Altre condizioni:

- **Patologie cardiache, cirrosi epatica, trattamento dialitico** devono essere segnalate al personale sanitario preventivamente

- **Diabete mellito insulino dipendente e non:** non eseguire alcuna dose di insulina o compressa orale, mantenere il digiuno assoluto, all'occorrenza si può assumere un tè dolce o un cucchiaino di miele (portare con se l'insulina)
- **Gravidanza e allattamento:** sospetta gravidanza o allattamento dovranno essere segnalati al personale sanitario.

Il referto e l'eventuale proseguimento terapeutico verrà consegnato direttamente dal medico successivamente all'esecuzione della colonscopia.

In caso di dubbi sulla preparazione o su altre indicazioni per l'esecuzione dell'esame non esitate a contattarci ai numeri sopra indicati.