


Preparazione all'esecuzione dell'EGDS



Ambulatorio di Endoscopia Digestiva

Tel. 0421.338442

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00

Reparto Chirurgia: tel 0421.338430-431
(24h/24h)

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS): Preparazione

- Osservare il **DIGIUNO** dalla mezzanotte (almeno 6 ore prima) per gli esami eseguiti al mattino, dal mattino per quelli eseguiti nel pomeriggio. Si può bere liquido chiaro (acqua, the zuccherato, camomilla, ecc. NO LATTE) fino a 2 ore prima;
- Assumere terapia farmacologica standard fino al giorno prima, no la mattina dell'esame;
- Sospendere farmaci IPP/protettori gastrici (Pantorc, Antra, etc) almeno due settimane prima dell'esecuzione dell'esame. Può assumere antiacidi (Maalox, Riopan, Gaviscon);
- Per l'eventuale terapia antidiabetica (insulina/orale) far riferimento al paragrafo dedicato;
- Per l'eventuale terapia anticoagulante far riferimento al paragrafo dedicato.

COSA PORTARE

- Impegnativa per esofagogastroduodenoscopia;
- Documentazione relativa ad altri problemi di salute;
- Documentazione di esami precedenti con eventuali referti istologici se disponibili.

IN OSPEDALE

- L'utente sottoposto a EGDS in sedazione deve essere accompagnato da una persona in grado di fornire e ricevere informazioni relative allo stato di salute dell'utente, in grado di poter attendere fino alla fine dell'esame e di poter condurre un veicolo
- L'ora di esecuzione dell'esame può essere diversa da quella dell'appuntamento
- Ultimata la gastroscopia si dovrà rimanere in osservazione presso i locali dell'endoscopia digestiva per circa 30 minuti
- I farmaci sedativi **eventualmente** usati durante l'esame possono causare sonnolenza. La guida di veicoli e firma di documenti non è pertanto opportuna per almeno **24 ore**

A CASA

- Osservare il digiuno per almeno un'ora dalla fine dell'esame e poi cominciare ad alimentarsi regolarmente
- se venissero eseguiti prelievi bioptici mantenere il digiuno per 1 ora e mezza dopo l'esecuzione dell'esame, poi cominciare a bere liquidi tiepidi e dopo 4 ore cominciare ad alimentarsi
- gli **eventuali** prelievi eseguiti durante la gastroscopia possono causare un leggero sanguinamento; se feci picce (nero carbone), il paziente deve chiamare e presentarsi per una visita di controllo.

Preparazione all'esecuzione dell'EGDS

Situazioni particolari

Terapie farmacologiche:

- **Anticoagulante o antiaggregante:** il paziente deve rivolgersi al proprio curante per la sospensione di tale terapia e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva. Oppure consultare il paragrafo specifico sul nostro sito (<https://www.rizzola.it/>)

Altre condizioni:

- **Patologie cardiache, cirrosi epatica, trattamento dialitico** devono essere segnalate al personale sanitario preventivamente
- **Diabete mellito insulino dipendente e non:** non eseguire alcuna dose di insulino terapia o compressa orale, mantenere il digiuno assoluto, all'occorrenza si può assumere un thè dolce o un cucchiaino di miele (portare con sè l'insulina)
- **Gravidanza e allattamento:** sospetta gravidanza o allattamento dovranno essere segnalati al personale sanitario.

Il referto e l'eventuale proseguimento terapeutico verranno consegnati direttamente dal medico successivamente all'esecuzione della gastroscopia.

In caso di dubbi sulla preparazione o su altre indicazioni per l'esecuzione dell'esame non esitate a contattarci ai numeri sopra indicati.