

OPUSCOLO INFORMATIVO PER L'UTENZA

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (OGTT) A SEGUITO DI SPECIFICA RICHIESTA del Medico inviante

Il/la Paziente si deve presentare al Centro Prelievi della Casa di Cura Rizzola al mattino, il più presto possibile, a digiuno da circa otto ore.

Dopo che avrà firmato il modulo per il consenso informato, il Paziente sarà sottoposto ad un primo prelievo di sangue sul quale verrà eseguito il "Glucotest". Nel caso in cui i valori di indicati dal test risultino inferiori a 126 mg/100ml si proseguirà con la prova da carico ed il Paziente dovrà bere la dose di glucosio necessaria per questo test (75 gr di glucosio disciolti in circa 150 ml di soluzione).

A seguire gli verranno praticati dei prelievi di sangue dopo 30, 60, 90, 120, 150, 180 minuti dopo la somministrazione della soluzione di glucosio, in funzione degli intervalli di tempo richiesti dal medico inviante.

Per eseguire questo esame, tra un prelievo e l'altro, il Paziente dovrà rimanere seduto senza mangiare, bere e fumare.

Nel caso in cui i valori di indicati dal Glucotest risultino superiori a 126 mg/100ml (Tratto da: WHO Recommendation 2011 Methods and criteria for diagnosing diabetes mellitus). il Paziente **NON** verrà sottoposto alla prova da carico e verrà rinviato al medico curante per un eventuale approccio anti diabetico.