

## OPUSCOLO INFORMATIVO PER L'UTENZA

### **CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO IN GRAVIDANZA**

La Paziente deve presentarsi al Centro Prelievi entro e non oltre le ore 7:00, a digiuno dalla mezzanotte. Le saranno illustrate le modalità di esecuzione del test e le sarà chiesto di sottoscrivere un "Consenso informato". Verrà quindi eseguito un primo prelievo per valutare la glicemia basale, e se il valore supera la soglia di 92 mg/dL (5.11 mmol/L) non si proseguirà il test in quanto in presenza di un risultato diagnostico, che andrà confermato da un ulteriore prelievo per glicemia a digiuno nei giorni successivi. In caso contrario, si procederà alla somministrazione del carico facendo bere alla paziente 150 mL di soluzione zuccherina contenente 75g di glucosio. Dopo un'ora (60') dalla somministrazione del carico si eseguirà un secondo prelievo per glicemia. In presenza di valori superiori a 180 mg/dL (10.0 mmol/L) non si proseguirà il test in quanto si tratterebbe di risultato diagnostico (Standards of Care ADA 2017); in caso contrario si procederà alla esecuzione di un terzo prelievo dopo 2 ore (120') dal carico orale.